

---

# Condiciones de trabajo, empleo y la salud. Primera Encuesta Argentina de Condiciones de Trabajo y Salud

---

**Centro de Investigación en Salud Laboral-CiSAL (UPF)  
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Argentina**

**María José Itatí Iñiguez**

Andrés A. Agudelo-Suárez

Cecilia I. Cornelio


Fernando G. Benavides

\*Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses

# Introducción- Datos laborales año 2009

---

- Población **general** Argentina: 36.446.000 personas
- Población **ocupada**: 15.192.000 personas
- Población ocupada con empleo **no registrado**: 36%
- Población asalariada con cobertura de **ART**: 69%



# Objetivo y metodología

---

- Describir la salud de la población trabajadora a partir de los datos de la I Encuesta Argentina de Condiciones de Trabajo y Salud según variables de laborales y socio-demográficas.
- Muestreo aleatorio polietápico. 7.195 trabajadores/as de todo el país ocupados en empresas privadas registradas de sectores económicos secundario y terciario.
- Estimación de **prevalencias** de 5 indicadores de salud según las variables del estudio.
- Calculo de **Odds Ratio** crudas y ajustadas, intervalos de confianza al 95%, para accidentes y enfermedades laborales y variables de organización del tiempo de trabajo.

# Resultados

## Características socio-demográficas y salud

	<b>Accidentes de trabajo</b>	<b>Enfermedades laborales</b>	<b>Síntomas de salud general</b>	<b>Síntomas de salud mental</b>	<b>Visitas al médico</b>
<b>Sexo</b>	Hombres (15%)	Mujeres (6%)	Ambos (50%)	Ambos (19%)	Mujeres (30%)
<b>Máximo nivel educativo</b>	Primario completo (22%)	Primario incomp (9%)	Universitarios (52%)	Primario incomp (28%)	Universitarios (31,5%)
<b>País de origen</b>	Inmigrantes (28%)	Inmigrantes (8%)	Inmigrantes (57%)	Ambos (19%)	Inmigrantes (30%)
<b>Vivir con menores de 14 años</b>	3 menores o + (20%)	3 menores o + (8%)	1 menor (55%)	3 menores o + (24%)	1 menor (29%)

# Resultados

## Organización del tiempo de trabajo y salud

	<b>Accidentes de trabajo</b>	<b>Enfermedades laborales</b>	<b>Síntomas de salud general</b>	<b>Síntomas de salud mental</b>	<b>Visitas al médico</b>
<b>Días de trabajo semana</b>	Lu-Sáb (17%)	Sem Irreg (8%)	Sem Irreg (55%)	Sem Irreg (25%)	Sem Irreg (32%)
<b>Horas de trabajo semanal</b>	Más 45hs/ sem (20%)	Más 45hs/ sem (6,5%)	Más 45hs/ sem (54%)	Más 45hs/ sem (23%)	Más 45hs/ sem (29%)
<b>Horas extras</b>	Sí (18%)	Sí (9%)	Sí (55%)	Sí (24,5%)	Sí (29%)
<b>Trabajo nocturno</b>	Sí (27%)	Sí (9%)	Ambos (50%)	Sí (21%)	Sí (31%)
<b>Turnos</b>	Sí (20,5%)	Sí (8%)	No(51%)	No (19%)	Sí (27%)

# Resultados - Análisis Multivariado

Tabla 1. Odds Ratio crudo (ORc) y ajustado<sup>1</sup> (ORa) e intervalo de confianza al 95% (IC95%), de variables de organización del tiempo de trabajo con accidentes de trabajo y enfermedades laborales, estratificando por sexo\*. Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Condiciones y Medio Ambiente Laboral. Argentina, 2009

	Accidentes de trabajo en el establecimiento		Enfermedades laborales desde que trabaja en el establecimiento	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
	ORa <sub>1</sub> (IC 95%)	ORa <sub>1</sub> (IC 95%)	ORa <sub>1</sub> (IC 95%)	ORa <sub>1</sub> (IC 95%)
<b>Días de trabajo semana anterior</b>				
Lunes a Viernes	1	1	1	1
Lunes a Sábado	1,54 (1,26-1,88)	0,58 (0,42-0,79)	1,22 (0,85-1,74)	0,61 (0,43-0,86)
Otros	1,66 (1,34-2,06)	0,84 (0,58-1,21)	1,92 (1,35-2,74)	0,23 (0,12-0,43)
<b>Horas de trabajo semanal habitual</b>				
Menos de 35hs	1	1	1	1
De 35 a 45 hs	1,11 (0,73-1,69)	1,74 (1,18-2,55)	1,80 (0,73-4,45)	1,70 (1,09-2,65)
Más de 45hs	1,78 (1,16-2,75)	3,03 (1,99-4,62)	2,62 (1,05-6,54)	2,02 (1,21-3,39)
<b>Horas extras</b>				
No	1	1	1	1
Sí	1,45 (1,21-1,74)	2,10 (1,50-2,93)	1,57 (1,15-2,13)	4,93 (3,45-7,04)
<b>Trabajo nocturno</b>				
No	1	1	1	1
Sí	2,46 (1,96-3,08)	2,26 (1,27-4,01)	2,31 (1,62-3,31)	1,18 (0,51-2,74)
<b>Rotación de turnos de trabajo</b>				
No	1	1	1	1
Sí	1,73 (1,40-2,14)	1,90 (1,20-3,00)	2,28 (1,64-3,17)	1,05 (0,55-2,01)

<sup>1</sup> En el modelo ajustado se incluyeron las siguientes variables de condiciones de vida: edad, nivel educativo, menores de 14 años que habitan en el hogar, país de origen

\* ORa calculadas sobre el total de casos válidos (excluyendo Ns-Nc) en cada variable

Se observaron diferencias según:

- Género
  - Calificación de la tarea
  - Estatus migratorio
- 
- La extensión de las horas y la irregularidad en la organización del tiempo de trabajo conllevó mayores daños a la salud, especialmente entre las mujeres.
  - Permitted localizar dimensiones prioritarias para el diseño de políticas preventivas.