







# Trayectoria laboral después de un episodio de incapacidad temporal por neoplasia maligna en una cohorte de trabajadores residentes en Cataluña, 2012–2013

Lear Claveras A, Ubalde-Lopez M (1, 2, 3), Serra Saurina L. (1, 2, 3)

(1) CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); (2) Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), Barcelona; (3) CiSAL-Centro de Investigación en Salud Laboral, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona)

#### **ANTECEDENTES**

No todos los individuos que han tenido un episodio de incapacidad temporal por neoplasia siguen formando parte del mercado laboral después de su tratamiento. En algunos casos el retorno al trabajo puede suponer un proceso complejo como consecuencia de las limitaciones físicas, emocionales y laborales relacionadas con la enfermedad que consecuentemente podrían alterar la trayectoria laboral posterior.

El <u>objetivo</u> de este estudio es evaluar el riesgo de salida del mercado laboral, por desempleo, incapacidad permanente o jubilación parcial después de un episodio de incapacidad temporal por neoplasia maligna.

## MÉTODOS

#### Diseño de estudio y fuentes de información:

• Estudio observacional prospectivo de asalariados afiliados a la Seguridad Social residentes en Cataluña e incluidos en la cohorte WORKss<sup>1</sup>, que iniciaron un primer episodio de incapacidad temporal entre 2012 y 2013.

Seguridad Social

Muestra Continua de Vidas Laborales
(1981-2014)

Cohorte WORKss

Cohorte WORKssCAT

Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM)

Registros de Incapacidad Temporal (2012-2013)

#### Análisis:

- Se aplicaron modelos de regresión de riesgos competitivos para calcular el subhazard ratio ajustado (sHRa), y el intervalo de confianza al 95% (IC95%), del riesgo de salida del mercado laboral por desempleo, incapacidad permanente o jubilación parcial en el año posterior a un episodio debido a neoplasia maligna respecto a otras patologías no malignas.
- Todos los análisis se estratificaron por sexo.

#### Variables:

Tiempo hasta el primer evento
(desempleo, incapacidad permanente o jubilación parcial)
),

Figura 1. Riesgo de salida del mercado laboral por desempleo, incapacidad permanente o

jubilación anticipada después de una ITcc por neoplasia maligna respecto a otras patologías no

Hombres

#### RESULTADOS

- En total se iniciaron 29.195 primeros episodios de incapacidad temporal entre 2012-2013 (el 56% en mujeres), 9.699 correspondieron a los diagnósticos analizados.
- Las neoplasias malignas representaron un 1,7% del total de grupos diagnósticos analizados.

alializados.				
	Nº episodios (%)		Duración mediana (p25 – p75)	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Mentales	981 (18,6%)	553 (12,4%)	18 (8-48)	19 (8-48)
Cardiovasculares	273 (5,2%)	336 (7,6%)	18 (9-37)	17 (7-36)
Musculo esqueléticas	2.927 (55,6%)	2.116 (47,7%)	14 (5-37)	9 (5-23)
Lesiones	992 (18,9%)	1.354 (30,5)	16 (7-42)	15 (7-38)
Neoplasia maligna	87 (1,7%)	80 (1,8%)	29 (12 – 95)	24 (12-67)
TOTAL	5.260 (100%)	4.439 (100%)	15 (6-40)	12 (5-33)

• Del total de los 442 episodios debidos a neoplasias (CIE10 C00-D49) el 37,7% fueron neoplasias malignas.

Neoplasias malignas más frecuentes						
Mujeres		Hombi	res			
Mama	39 (44,8%)	Órganos genitourinarios	38 (47,5%)			
Órganos genitourinarios	15 (17,2%)	Piel	10 (12,5%)			
Piel	14 (16,1%)	Órganos respiratorios	9 (11,2)			
Otros	19 (21,8%)	Otros	23 (28,7%)			
TOTAL	87 (100%)	TOTAL	80 (100%)			

• El 80% de las personas trabajadoras continuaron empleadas en el año posterior a un episodio debido a una neoplasia maligna.

# Referencia

0.4

Desempleo

malignas.

SHRa — IC95%(-) — IC95%(+)

1. Gómez MA, Durán X, Zaballa E, et al. Cohort profile: the SpanishWORKing life Social Security (WORKss) cohort study. BMJ. 2015

8.4

Jubilación

anticipada





5.8

Incapacidad

permanente





0.9

Incapacidad

permanente

Desempleo



2.4

Jubilación

anticipada

### CONCLUSIONES

- En las mujeres, la jubilación parcial y la incapacidad permanente parecen ser alternativas de salida del mercado laboral después de una incapacidad temporal debida a neoplasia maligna.
- El análisis de los determinantes relacionados con la trayectoria laboral después de una neoplasia maligna ayudaría en el diseño de intervenciones y programas efectivos de retorno al trabajo.